Albaranzeuli bianco



0MTP13



Collection Vassal-Montpellier


Vass2R06s496-500

0Mtp13

~~7.18 S 10~~
Albaranzeuli bianco
2R6 s496-500

Albaranzeuli bianco
7.18 S 10 ⊕














DESIGNATION : Albaranzeuli bianco   mi

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG S Souche 10

Vigueur : 1,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-7-86   X

Date de Maturité : 8-9-86   +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C   14

BAIE : TG - G - M - P   19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 2   avec pépins - apyrène

s3 1

s4 2   JUS : inc. - coloré

s5 1

CLOS 7 RANG 18 Souche S 10

Désignation : Albaranzeuli bianco

CHARGE :   Année :   8

Véraison :   28-7

Maturité :   12-9-88   +4

Mill. : 0,5   Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 18

L - M - C

Vigueur : 1,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE :   Année :

TG - G - M - P - Dim. : 19

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 1   Avec pépins - apyrène

s2 2   JUS : inc. - coloré

s3 1

s4 2

s5 1

Année : 1985
Emplacement.......7 18 S 10.......... Désignation.Albaranzeuli bianco.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1-4					
1	2	1					
2	2	1					
3	f						
4	2	1					
5	2	1				0	

Dle 1-4-85

ni

Année : 1986
Emplacement.....7 18 S 10...... Désignation.Albaranzeuli bianco

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	28.3				
1	4	1	3 x				
2	2	0	1 x				
3	f						
4	4	1	2 x				
5	4	0	2 x				

D le 28.3.86 +3

Année : 1987

Emplacement 7 18 S 10 Désignation Albarazzuli bianco

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	31.3				
1	4	0	0				
2	3	0	0				
3 faible							
4	4	1	2 ×				
5	4	1	2 ×				

31.3 87 +4

ANNEE 1988

NOM Nasco EMPLACEMENT 7 18 S 11

205302

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité ×	Floraison début	mi/f ×	fin	Véraison début	mi/v ×	fin	Maturité ×
1	4			4								
2	3			0								
3	3			4	7	30.5	1.6	3.6	1.8	4.8	8.8	5.9.88
4	3			4								
5	4			1								

Pourriture : 0 Port : mi érigé à courbé Vigueur : 2,5 moyenne +2 +3

1.6

+1

ANNEE 1987

NOM Albaranzeuli bianco EMPLACEMENT 7 18 S 10

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	31.3	7.4	2		1.6	6.6	11.6				
2	3	31.3	3.4	1		1.6	6.6	11.6				
3	2	23.3	27.3	0								
4	4	23.3	31.3	2		1.6	6.6	10.6	3.8	6.8 +2	10.8	14.9 +4
5	4	27.3	31.3	1		1.6	6.6	11.6				
	17		31.3 +4	6	3,5		6.6 −1					

Port 1/2 engé

Vigueur 1,5

ANNEE 1988

NOM Albaranzeuli bianco EMPLACEMENT 7 18 S 10

☿

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3			1								
2	3			2	4	31.5	3.6	6.6	28.7	1.8	8.8	5.9.88
3 }												
4	3			2								
5	4			1								
							3,6 +3			+2		+3

Pourriture : 0 Port : mi engé Vigueur : 1,5 faible

ANNEE 1990

NOM Albaranzeuli bianco / nù EMPLACEMENT 7 18 S 10

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1												
2												
3						18.5	21.5	23.5	16.7	19.7	23.7	
4							+1			+1		
5												

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : Vigueur :

DESIGNATION : Albaranzeuli bianco

EMPLACEMENT : 7-18 S10 2-5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

[illegible] roux [illegible] - carminé (2) [très légt. = aux pointes] - à liséré carminé 3 - [illegible] bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) [→ jaune] - [illegible]

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) [jaune] - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à [illegible]
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille dét[illegible]

Calvo 83

Désignation : Albaranzeuli biânco

Emplacement : 7-18 S 10 s.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 4e

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 4e

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Albaranzeuli bianco

Désignation :

Emplacement : 7-18 S10 s.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte (2) - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 84

Désignation : Albaranzeuli bianco

Emplacement : 7.18 S 10 s. 2

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert

Calvo 84

2342

Nº d'ordre : Albaranzeuli bianco

Désignation : 7-18 S 10 s-5

Emplacement :

GRAPPE

18

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 19 × 19).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. (un peu)

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) assez

Calvo 84

DENOMINATION : Albaranzeuli bianco
EMPLACEMENT : 7-18 S 10 n.5 (un peu faible)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....8..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) légt de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation : Albaranzeuli bianco

Emplacement : 7.18S.10D.5

Angle des nervures : 1 - (2) - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

L_1/L_2 : (7) - 8 - 9

L_2/L : (10) - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - (24)

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - (29)

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)

Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38) - (39)

Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : (40) - (41)

Dents (angle) : (42) - (43) - 44

Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)

Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - (58) - (59)

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües